

| | | | | | |
|---------------|--|-------------|--|-----|--|
| Μονάδα Υγείας | | Ημερομηνία | | Ωρα | |
| Βάρδια | | Παρατηρητής | | | |

Εργαλείο συμμόρφωσης: Παρατηρήσεις καθετηριασμού fistula (Αυτόχθονη αρτηριοφλεβική επικοινωνία)

(Χρησιμοποιήστε ένα "√" αν η δράση εκτελείται σωστά, μια "—" αν δεν εκτελείται. Εάν δεν παρατηρηθεί, αφήστε κενό)

| Επαγγελματίας | Καθαρισμός της περιοχής με σαπούνι και νερό | Εκτέλεση της Υγιεινής των χεριών | Εφαρμογή νέων καθαρών γαντιών | Κατάλληλη εφαρμογή αντσηπτικού δέρματος | Διάθεση χρόνου στο αντσηπτικό για να στεγνώσει | Καμία επαφή με το σημείο της fistula (Μετά την αντσηψία) | Εκτέλεση καθετηριασμού υπό άσηπτες συνθήκες | Σύνδεση με το κύκλωμα του μηχανήματος με άσηπτη τεχνική | Αφαίρεση γαντιών | Εκτέλεση της Υγιεινής των χεριών |
|---------------|---|----------------------------------|-------------------------------|---|--|--|---|---|------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Επαγγελματίας: I = γιατρός, N = νοσηλεύτρια, T = τεχνικός, Φ = φοιτητής, A = άλλο

Χρονική διάρκεια παρατήρησης:λεπτά

Αριθμός διαδικασιών που εκτελούνται σωστά :

Συνολικός αριθμός των διαδικασιών που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου:

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΧΟΛΙΑ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ



| | | | | | |
|---------------|--|-------------|--|-----|--|
| Μονάδα Υγείας | | Ημερομηνία | | Ωρα | |
| Βάρδια | | Παρατηρητής | | | |

Εργαλείο συμμόρφωσης: Παρατηρήσεις αποσύνδεσης fistula (Αυτόχθονη αρτηριοφλεβική επικοινωνία)

(Χρησιμοποιήστε ένα "√" αν η δράση εκτελείται σωστά, μια "—" αν δεν εκτελείται. Εάν δεν παρατηρηθεί, αφήστε κενό)

| Επαγγελματίας | Εκτέλεση της Υγιεινής των χεριών | Χρήση νέων καθαρών γαντιών | Αποσύνδεση από το κύκλωμα του μηχανήματος | Απομάκρυνση των βελονών με άσηπτη τεχνική | Εφαρμογή καθαρών γαντιών για τη συμπίεση του σημείου εισόδου της βελόνας | Εφαρμογή καθαρής γάζας /επιδέσμου στο σημείο εισόδου της βελόνας | Αφαίρεση γαντιών | Εκτέλεση της Υγιεινής των χεριών |
|---------------|----------------------------------|----------------------------|---|---|--|--|------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Επαγγελματίας: I = γιατρός, N = νοσηλεύτρια, T = τεχνικός, Φ = φοιτητής, A = άλλο

Χρονική διάρκεια παρατήρησης:λεπτά

Αριθμός διαδικασιών που εκτελούνται σωστά :

Συνολικός αριθμός των διαδικασιών που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου:

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΧΟΛΙΑ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ



| | | | | | |
|---------------|--|-------------|--|-----|--|
| Μονάδα Υγείας | | Ημερομηνία | | Ωρα | |
| Βάρδια | | Παρατηρητής | | | |

Εργαλείο συμμόρφωσης: Παρατηρήσεις σύνδεσης και αποσύνδεσης καθετήρα αιμοκάθαρσης
 (Χρησιμοποιήστε ένα "√" αν η δράση εκτελείται σωστά, μια "—" αν δεν εκτελείται. Εάν δεν παρατηρηθεί, αφήστε κενό)

| Διαδικασία που παρατηρείται, Σ = Σύνδεση Α= Αποσύνδεση | Επαγγελματίας | Ορθή εφαρμογή μάσκας | Εκτέλεση της Υγιεινής των Χεριών | Εφαρμογή νέων καθαρών γαντιών | Αποσύνδεση του καθετήρα από το κύκλωμα του μηχανήματος με άσηπτη τεχνική (Αποσύνδεση μόνο) | Τρίψιμο του σημείου σύνδεσης (Hub) του καθετήρα με αντισηπτικό | Διάθεση χρόνου στο αντισηπτικό για να στεγνώσει | Σύνδεση του καθετήρα με το κύκλωμα του μηχανήματος με άσηπτη τεχνική (Σύνδεση μόνο) | Τοποθέτηση νέων πομάτων με άσηπτη τεχνική (μετά την αποσύνδεση) | Αφαίρεση γαντιών | Εκτέλεση της Υγιεινής των Χεριών |
|--|---------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|--|--|---|---|---|------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Επαγγελματίας: Ι = γιατρός, Ν = νοσηλεύτρια, Τ = τεχνικός, Φ = φοιτητής, Α = άλλο

Χρονική διάρκεια παρατήρησης:..... λεπτά

Αριθμός διαδικασιών που εκτελούνται σωστά :

Συνολικός αριθμός των διαδικασιών που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου:

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΧΟΛΙΑ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ



| | | | | | |
|---------------|--|-------------|--|-----|--|
| Μονάδα Υγείας | | Ημερομηνία | | Ωρα | |
| Βάρδια | | Παρατηρητής | | | |

Εργαλείο συμμόρφωσης: Παρατηρήσεις της φροντίδας του σημείου εξόδου του καθετήρα
(Χρησιμοποιήστε ένα "√" αν η δράση εκτελείται σωστά, μια "—" αν δεν εκτελείται. Εάν δεν παρατηρηθεί, αφήστε κενό)

| Επαγγελματίας | Ορθή εφαρμογή μάσκας | Εκτέλεση της Υγιεινής των Χεριών | Εφαρμογή νέων, καθαρών γαντιών | Κατάλληλη εφαρμογή αντισηπτικού δέρματος | Διάθεση χρόνου στο αντισηπτικό για να στεγνώσει | Καμία επαφή με το σημείο εξόδου (μετά την αντισηψία) | Εφαρμογή αντιμικροβιακής αλοιφής | Εφαρμογή επιθεμάτων με άσηπτη τεχνική | Αφαίρεση γαντιών | Εκτέλεση της Υγιεινής των Χεριών |
|---------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|--|---|--|----------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Επαγγελματίας: I = γιατρός, N = νοσηλεύτρια, T = τεχνικός, Φ = φοιτητής, A = άλλο

Χρονική διάρκεια παρατήρησης:..... λεπτά

Αριθμός διαδικασιών που εκτελούνται σωστά :

Συνολικός αριθμός των διαδικασιών που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου:

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΧΟΛΙΑ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ



| | | | | | |
|---------------|--|-------------|--|-----|--|
| Μονάδα Υγείας | | Ημερομηνία | | Ωρα | |
| Βάρδια | | Παρατηρητής | | | |

Εργαλείο συμμόρφωσης: Προετοιμασία ενέσιμων φαρμάκων αιμοκάθαρσης

(Χρησιμοποιήστε ένα "✓" αν η δράση εκτελείται σωστά, μια "—" αν δεν εκτελείται. Εάν δεν παρατηρηθεί, αφήστε κενό).

| Επαγγελματίας | Η προετοιμασία των φαρμάκων γίνεται σε καθορισμένο χώρο | Ο χώρος προετοιμασίας των φαρμάκων είναι καθαρός* | Επιθεώρηση των φιαλιδίων** | Εκτέλεση της Υγιεινής των χεριών | Απολύμανση των φιαλιδίων | Χρήση νέας σύριγγας και βελόνας | Η προετοιμασία των φαρμάκων γίνεται υπό άσηπτες συνθήκες | Απόρριψη όλων των φιαλιδίων μιας δόσης | Κατάλληλη απόρριψη, ή αποθήκευση των φιαλιδίων πολλαπλών δόσεων |
|---------------|---|---|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--|--|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Επαγγελματίας: I = γιατρός, N = νοσηλεύτρια, T = τεχνικός, Φ = φοιτητής, A = άλλο

Χρονική διάρκεια παρατήρησης:..... λεπτά

Αριθμός διαδικασιών που εκτελούνται σωστά :

Συνολικός αριθμός των διαδικασιών που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου:

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΧΟΛΙΑ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

* Η προετοιμασία των ενέσιμων φαρμάκων πρέπει να γίνεται σε προκαθορισμένο καθαρό χώρο, ελεύθερο από πηγές μόλυνσης (π.χ. αίμα, σωματικά υγρά, μολυσμένο εξοπλισμό)

** Τα φιαλίδια θα πρέπει να απορρίπτονται αν η ασηψία τους είναι αμφίβολη, ή η ημερομηνία λήξης έχει παρέλθει. Ένα φιαλίδιο πολλαπλών δόσεων που φυλάσσεται πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία ανοίγματός του.



| | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|--|------------|--|
| Μονάδα Υγείας | | Ημερομηνία | | Ωρα | |
| Βάρδια | | Παρατηρητής | | | |

Εργαλείο συμμόρφωσης: Χορήγηση ενέσιμων φαρμάκων αιμοκάθαρσης

(Χρησιμοποιήστε ένα "√" αν η δράση εκτελείται σωστά, μια "—" αν δεν εκτελείται. Εάν δεν παρατηρηθεί, αφήστε κενό).

| Επαγγελματίας | Ορθή μεταφορά της φαρμακευτικής αγωγής στον ασθενή * | Εκτέλεση της Υγιεινής των χεριών | Εφαρμογή καθαρών γαντιών | Απολύμανση του σημείου σύνδεσης του καθετήρα με αντισηπτικό ** | Ασηπτη χορήγηση της φαρμακευτικής αγωγής | Απόρριψη της σύριγγας στο σημείο χρήσης | Αφαίρεση γαντιών | Εκτέλεση της Υγιεινής των χεριών |
|---------------|--|----------------------------------|--------------------------|--|--|---|------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Επαγγελματίας: I = γιατρός, N = νοσηλεύτρια, T = τεχνικός, Φ = φοιτητής, A = άλλο

Χρονική διάρκεια παρατήρησης:..... λεπτά

Αριθμός διαδικασιών που εκτελούνται σωστά :

Συνολικός αριθμός των διαδικασιών που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου:

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΧΟΛΙΑ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

* Τα φάρμακα θα πρέπει να μεταφέρονται απευθείας από το χώρο προετοιμασίας της φαρμακευτικής αγωγής σε κάθε ασθενή ξεχωριστά. Τα φάρμακα θα πρέπει να προετοιμάζονται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο χρόνο χορήγησης της φαρμακευτικής αγωγής. Φάρμακα που δεν χορηγούνται αμέσως, πρέπει να επισημαίνονται κατάλληλα από το πρόσωπο που τα προετοίμασε.

** Κατάλληλα αντισηπτικά: αλκοολούχο διάλυμα χλωρεξιδίνης, ιωδιούχος ποβιδόνη και 70% αλκοόλη

